

Tablo 1. DSÖ bölgelerinde nedene göre yıllık 5 yaş altı çocuk ölümleri sayıları, 2000-2003 tahminleri

Neden	Afrika		Amerika		Güneydoğu Asya		Avrupa		Doğu Akdeniz		Batı Pasifik	
	110944		77885		178987		50738		67918		130292	
	(000)	%	(000)	%	(000)	%	(000)	%	(000)	%	(000)	%
Toplam ölümler	4396	100	439	100	3070	100	263	100	1409	100	1020	100
HIV/AIDS	285	6	6	1	22	1	1	0	4	0	3	0
Diyareli hastalıklar	701	16	51	12	552	18	35	13	245	17	178	17
Kızamık	227	5	1	0	103	3	2	1	52	4	11	1
Sıtma	802	18	1	0	12	0	0	0	37	3	1	0
Akut solunum yolu Enfeksiyonları	924	21	54	12	590	19	32	12	292	21	137	13
Neonatal sebepler	1148	26	195	44	1362	44	116	44	610	43	480	47
Yaralanmalar	76	2	23	5	71	2	17	7	45	3	73	7
Diğerleri	233	5	109	25	359	12	61	23	124	9	137	13

Tablo 2. DSÖ bölgelerinde nedene göre yıllık neonatal ölüm sayıları, 2000-2003 tahminleri

Neden	Afrika		Amerika		Güneydoğu Asya		Avrupa		Doğu Akdeniz		Batı Pasifik	
	110944		77885		178987		50738		67918		130292	
	(000)	%	(000)	%	(000)	%	(000)	%	(000)	%	(000)	%
Toplam neonatal ölümler	1148	100	195	100	1362	100	116	100	610	100	480	100
Neonatal tetanoz	108	9	2	1	58	4	1	1	72	12	16	3
Ağır enfeksiyon	313	27	34	17	374	27	21	18	174	28	101	21
Doğum asfiksisi	274	24	36	19	314	23	21	18	122	20	127	26
Diyareli hastalıklar	40	3	1	1	37	3	1	1	22	4	7	1
Konjenital anomaliler	70	6	31	16	77	6	21	19	54	9	40	8
Erken doğum	265	23	78	40	413	30	44	38	132	22	152	32
Diğerleri	78	7	13	7	89	7	7	6	35	6	36	8

Kaynak: The World Health Report 2005, Make every mother and child count